

# Assistance Publique - Hôpitaux de Paris Hôpital St Louis

1 avenue Claude Vellefaux - 75475 PARIS Cedex 10

Tel : 01 42 49 49 49

## **Recommandations après splénectomie**

Madame Monsieur,

Vous avez subi une ablation de la rate (*splénectomie*). L'ablation de la rate sensibilise l'organisme à certains agents infectieux tels que le pneumocoque, l'*haemophilus influenzae*, le méningocoque et l'agent du paludisme : le plasmodium.

La prévention de ces infections repose sur la vaccination et la prise de médicaments anti-infectieux.

Les vaccins suivants sont à réaliser tous les 5 à 10 ans :

- haemophilus (ActHIB®)
- pneumocoque (Pneumo 23®)

Une prescription d'antibiotique (amoxicilline 500 mg/jour ou josacyne 500 mg/jour en cas d'allergie à la pénicilline) vous a été remise à la sortie du service pour une période d'un mois. Si vous êtes porteur d'une maladie hématologique, nous vous conseillons de consulter l'hématologue qui vous suit pour qu'il vous précise la durée souhaitable de la prophylaxie ; elle peut être prolongée indéfiniment.

Lors de chaque accès de fièvre il est nécessaire de consulter votre médecin traitant pour qu'il vous prescrive de l'amoxicilline 500 mg 3 fois par jour (ou de la josacyne 500 mg 3 fois par jour en cas d'allergie à la pénicilline). Si la fièvre persiste, une hospitalisation peut devenir nécessaire.

La prophylaxie contre le paludisme est particulièrement recommandée en cas de voyage à l'étranger en zone impaludée.