

Oesophage caustique

Oesogastrectomie et jéjunostomie

TECHNIQUES :

- Laparotomie et cervicotomie
- Durée d'intervention : 4 heures
- Thoracotomie droite si brûlure de la bronche souche gauche

CONSULTATION :

- Commande prévisionnelle de 3 culots globulaires
- Urgence
- Signes de gravité : CIVD, acidose métabolique
- Recherche systématique de toxiques

PRÉOPÉRATOIRE ::

- Fibroscopie trachéo-bronchique à la recherche d'une brûlure de la bronche souche gauche qui impose alors la réalisation d'un patch pulmonaire par thoracotomie droite avant la laparotomie
- Si détresse respiratoire, intubation trachéale avant la fibroscopie digestive

PEROPÉRATOIRE :

- Position : décubitus dorsal
- Antibio prophylaxie par Méfoxin®
- 2 voies veineuses
- Sonde vésicale
- Si patch pulmonaire, thoracotomie droite première sans exclusion pulmonaire ; IOT car mobilisation de la sonde trachéale en peropératoire
- Si intubation préopératoire pour détresse respiratoire, pas d'extubation en fin d'intervention

POSTOPÉRATOIRE :

- Séjour en SSPI la nuit suivant l'intervention
- Lovenox® 0,4 ml
- Kinésithérapie respiratoire
- Jéjunostomie en déclive
- Laryngoscopie à J1 si notion de brûlure pharyngo-laryngée
- Consultation psychiatrique à distance