

Médicaments utilisés au Bloc opératoire DILUTION - PRÉSENTATION – CODAGE

1 – DILUTION DES MÉDICAMENTS :

- Alfentanil : Seringue de **10 ml**
Non dilué
Concentration : 500 µg/ml

- Atracurium : Seringue de **5 ml**
Non dilué
Concentration : 10 mg/ml

- Atropine : Seringue de **5 ml** marquée par un **bouchon rouge**
Non dilué
Concentration : 0,5 mg/ml

- Célocurine : Seringue de **10 ml**
Dilution : 1 ampoule de 100 mg ramenée à 10 ml
Concentration finale : 10 mg/ml

- Éphédrine : Seringue de **10 ml** marquée par un **bouchon rouge**
Dilution : 1 ampoule de 30 mg ramenée à 10 ml
Concentration finale : 3 mg/ml

- Étomidate : Seringue de **20 ml**
Non dilué
Concentration : 2 mg/ml

- Kétamine : Seringue de **10 ml**
Non dilué
Concentration : 10 mg/ml

- Lidocaïne : Seringue de **5 ml**
Non dilué
Concentration : 10 mg/ml

- Midazolam : Seringue de **5 ml**
Dilution : 1 ampoule de 5 mg ramenée à 5 ml
Concentration finale : 1 mg/ml

- Néostigmine Seringue de **5 ml**
Non dilué
Concentration de 0,5 mg/ml

- Néosynéphrine : Seringue de **10 ml** marquée par un **bouchon rouge**
1^{re} dilution : 1 ampoule de 5 mg ramenée à 10 ml
2^e dilution : 1 ml de la solution précédente ramenée à 10 ml
Concentration finale : 50 µg/ml

- **Propofol 1%** : Seringue de **20 ml**
Non dilué
Concentration : 10 mg/ml
- **Rémifentanil** : Seringue de **50 ml**
Dilution : 1 ampoule de 2 mg ramenée à 40 ml
Concentration : 50 µg/ml
- **Rocuronium** : Seringue de **5 ml**
Non dilué
Concentration : 10 mg/ml
- **Sufentanil** : Seringue de **10 ml**
Non dilué
Concentration : 5 µg/ml
- **Thiopental** : Seringue de **20 ml**
1^{re} dilution : 1g dilué dans 20 ml
2^e dilution : 10 ml de la solution précédente ramenés à 20 ml
Concentration finale : 2,5 % soit 25 mg/ml

2 – PRÉPARATION et UTILISATION DES MÉDICAMENTS

- **Principe 1 :** **Étiquettes** pré-imprimées avec un **code couleur** pour les spécialités les plus utilisées, à coller sur les seringues ; **la concentration est à préciser sur l'étiquette**
- **Principe 2 :** **Préparation extemporanée** (exception faite des morphiniques)
- **Principe 3 :** **Un plateau** d'anesthésie à usage unique **par patient**
- **Principe 4 :** **Pas d'injection** de médicament **sans monitoring adapté**

3 – CODAGE COULEUR par FAMILLE de MÉDICAMENTS :

11 médicaments disposent d'**étiquettes pré-imprimées** avec **codage couleur** :

Étomidate

Propofol

Lidocaïne

Atracurium

Célocurine

Atropine

Rémifentanil

Sufentanil

Éphédrine

Midazolam

Néostigmine